



風濕科常見的用藥

專助 彭靜尼

常見的藥物



治療的疾病

- 類風濕性關節炎
- 僵直性脊椎炎
- 乾癬性關節炎
- 紅斑性狼瘡、乾燥症
- 硬皮症
- 貝賽氏症 ……等

IMURAN 50mg/tab (Azathioprine)/壓彼迅

- 顏色：綠色
- 形狀：圓形
- 劑型：錠劑
- 外觀：PCH、AZP50



IMURAN 50mg/tab (Azathioprine) / 壓彼迅

- 治療：類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、血小板缺乏症…等
- 常見的副作用：全血球降低（白血球、紅血球及血小板）、口腔潰瘍、胰臟炎、肝功能異常…



IMURAN 50mg/tab (Azathioprine)/壓彼迅

- 注意事項：

1. 定期抽血（白血球、紅血球、血小板、肝功能）
2. 公共場所或感冒流行季節請戴口罩
3. 保持口腔清潔



Hydroxychloroquine sulfate (Plaqueni 1) / 必賴克慶

- 顏色：白色
- 形狀：圓形
- 劑型：錠劑
- 外觀：200



Hydroxychloroquine sulfate (Plaquenil)/必賴克廔


- 治療：類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症…等
- 常見的副作用：色素沉著、肌肉無力、皮膚癢、眼睛病變…



Hydroxychloroquine sulfate (Plaquenil)/必賴克慶

- 注意事項：

1. 如有皮膚起疹子，請告知醫師
2. 定期眼科追蹤



SULFASALAZine 500 mg/tab

(Salazopyrin) 斯樂

- 顏色：褐色
- 形狀：橢圓形
- 劑型：錠劑
- 外觀：KPH·102



SULFASALAZine 500 mg/tab (Salazopyrin) / 斯樂

- 治療：類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、潰瘍性結腸炎…等
- 常見的副作用：過敏、噁心、嘔吐、皮膚癢、白血球降低、貧血、肝功能異常、黃疸…



SULFASALAZine 500 mg/tab (Salazopyrin) / 斯樂

- 注意事項：

1. 如有皮膚起疹子，請告知醫師
2. 定期監測血液、肝功能




Methotrexate 2.5 mg (MTX) / 治善

- 顏色：黃色
- 形狀：圓形
- 劑型：錠劑
- 外觀：M 2.5



Methotrexate 2.5 mg (MTX) / 治善

- 治療：類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡併急性關節腫脹、慢性蕁麻疹、乾癬...等



- 常見的副作用：口腔潰瘍、全血球降低（白血球、紅血球及血小板）、肝腎功能異常、骨髓功能受抑制...

Methotrexate 2.5 mg (MTX) / 治善

- 注意事項：

1. 定期監測血液、肝腎功能
2. 觀察有無口腔潰瘍，保持口腔清潔
3. 到公共場所需戴口罩
4. 使用期間須避孕，停藥6個月方可懷孕



MTX（治善）及 folic acid（葉酸） 的使用方法

- 至善：一星期服用三次

- 例如：星期三服用

→ 星期三，早上9點一次


晚上9點一次

→ 星期四，早上9點一次


* 至善  需配合葉酸  兩粒

星期三：至善 3 粒 / 葉酸 6 粒


- 星期三，早上 9 點



- 晚上 9 點




- 星期四，早上 9 點



星期三：至善 4 粒 / 葉酸 8 粒


- 星期三，早上 9 點



- 晚上 9 點



- 星期四，早上 9 點



Sandimmun Neoral 100 mg/cap (Cyclosporin) / 新體睦

- 顏色：灰色
- 形狀：長條形
- 劑型：膠囊
- 外觀：25mg、100mg



Sandimmun Neoral 100 mg/cap (Cyclosporin) / 新體睦

- 治療：類風濕性關節炎、狼瘡性腎炎、硬皮症、乾癬、皮膚炎…等
- 常見的副作用：高血壓、腎臟毒性、肝臟毒性、腳抽筋、多毛症…



Sandimmun Neoral 100 mg/cap (Cyclosporin) / 新體睦


- 注意事項：

1. 監測血壓
2. 定期驗血（肝、腎功能）
3. 監測血中藥物濃度



Cyclophosphamide 50mg/tab (Syklofosamid)/愛德星

- 顏色：暗紅色
- 形狀：圓形
- 劑型：錠劑
- 外觀：



Cyclophosphamide 50mg/tab (Syklofosamid)/愛德星

- 治療：類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、血管炎、血小板缺乏症…等
- 常見的副作用：噁心、嘔吐、出血性膀胱炎、精蟲減少、卵巢功能提早萎縮、皮膚壞死、白血球降低、不孕…





Cyclophosphamide 50mg/tab (Syklofosamid)/愛德星

- 注射時的注意事項：
 1. 切勿漏針，點滴注射會疼痛時要告之護理人員，因為會造成皮膚的壞死
 2. 打完針，要多喝水並解尿，預防出血性膀胱炎
 3. 打針後的第10~14天白血球會降至最低
 4. 定期驗血球
 5. 到公共場所需戴口罩



常見的藥物



謝謝聆聽！

慈濟大學醫學院附屬醫院免疫中心