

佛教大林慈濟綜合醫院

門診衛教記錄表

一、主辦單位：過敏免疫風濕中心

二、衛教主題：sulfasalazine藥物介紹

三、衛教日期：95 年 10 月 20 日

四、衛教時間：9：30 ~ 10：00

五、主講者/記錄者：張智誠/朱玲瑩

內 容 摘 要

sulfasalazine (斯樂腸溶錠)藥物介紹

- 學名：sulfasalazine
- 商品名：Salazopyrin®
- 中文商品名：斯樂腸溶錠
- 劑量規格：500 mg/tab
- 包裝：100 顆/瓶 (輝瑞)
- 分類：磺胺藥

外觀：



藥理作用：

- 抗發炎
- 免疫抑制
- 抗菌作用

用途：

- 類風濕性關節炎

- 僵直性脊椎炎
- 發炎性腸道疾病
- 潰瘍性結腸炎

用法：

- 治療類風濕性關節炎至少需要 4-12 週才有療效；但也可能需要服用一年或更長的時間。
- 應整粒吞服，不要嚼碎，不宜剝半及磨粉；並於飯後立即服用或與少量點心一同服用，服用時應喝大量白開水。

用量：

- 第 1 週：每天 1 次，每次服用 1 顆
- 第 2 週：每天 2 次，每次服用 1 顆
- 第 3 週：每天 2 次，每次服用 1、2 顆
- 第 4 週以後：每天 2 次，每次服用 2 顆
- 最大劑量：每天 2 次，每次服用 3 顆

用量：

- 1 週：每天 1 次，每次服用 1 顆
- 1 週：每天 2 次，每次服用 1 顆
- 2-4 週：每天 2 次，每次服用 1-2 顆
- 維持劑量：每天 2 次，每次服用 2 顆
- 最大劑量：每天 2 次，每次服用 3 顆

忘記服藥時該怎麼辦：

- 想起時，立即服用。若已接近下一次的服藥時間，只需服用下次劑量。千萬不要服用雙倍劑量。

注意事項：

- 在治療過程中，應持續服藥，千萬不要以為症狀消失就擅自停藥。
- 請連同藥袋儲存於緊密容器內，於室溫、乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。
- 某些人服用此藥，會對日光或太陽燈產生皮膚過敏的現象，易發生皮膚出疹、皮膚癢、發紅、曬黑、變色，故應盡量避免日晒。
- 尿液或皮膚呈現橘黃色，為正常現象。

有下列情形應告知醫生：

- 若有懷孕、授乳，腎臟、肝臟、血液疾病或腸道阻塞、尿路阻塞，曾經對磺胺類藥物或其他藥物發生過敏者、蠶豆症(G6PD 缺乏)的病人。

副作用：

- 頭痛、光過敏、食慾不振、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉。
- 皮膚出紅疹、皮膚癢、蕁麻疹。
- 白血球減少、貧血、血小板減少。

監測：

- 監測是否有腹瀉或腹痛的情況發生。要定期監測血容比、網狀紅血球、血小板及白血球的數值；此外，尿液分析，肝臟、腎臟功能也都要定期監測。

類風濕性關節炎-藥物治療

- 消炎止痛藥
- DMARDs (延緩疾病的進展)
- 類固醇
- 免疫抑制劑
- 生物製劑 (恩博…)
- 外科疾病：手術
- 內科疾病：藥物控制
- **理想的藥物：**

使用方便、療效佳、副作用少